

Suporte Avançado

de Vida em Afogamento

Dr David Szpilman – Diretor Médico

SAVA.7. Detalhes no APH no local, no deslocamento e equipamentos essenciais – 10 min



Acionamento do APH

O que levar para o atendimento?

- Educação de todos os envolvidos na cadeia de atendimento ao afogado, é fundamental. Se o atendimento de APH é realizado em área onde existam guarda-vidas ou sistema de atendimento básico a afogamentos, o treinamento em classificar o afogamento conforme sua severidade ajuda a equipe do APH planejar o que será necessário levar e/ou providenciar outros recursos.
- Tenha sempre um flutuador profissional em área de eventos aquáticos. Além do material comum de EPI necessário ao atendimento, é importante sempre ter algum tipo de flutuador profissional, que possa ser utilizado para parar o afogamento, caso o APH chegue ao local onde não exista guarda-vidas ou caso sua chegada seja antes da equipe de resgate aquático.
- Estacione a ambulância em local mais próximo ao evento aquático, mas em segurança.
- Leve apenas o equipamento mais necessário em ordem de prioridade



SAVA.7. Detalhes no APH no local, no deslocamento e equipamentos essenciais – 10 min

Kit Ressuscitação

É o material avançado essencial para ser levado a areia/piscina para dar o primeiro atendimento ao afogado de qualquer grau. A prioridade e a simplicidade do material devem ser direcionadas ao grau 6 ou PCR, atendendo também aos outros graus de menor gravidade.



www.sobrasa.org



- ✓ 2 pares de luvas de procedimento
- ✓ Ambu + máscara (2 tamanhos)
- ✓ Monitor/desfibrilador manual
- ✓ Laringoscópio (lâminas peq. e grande) testado + TOT (tam. 5.0 e 7.0) testados
- ✓ Aspirador elétrico/manual + 2 seringas de 10 ml + guia de TOT + fixador de TOT + estetoscópio
- ✓ Cilindro de oxigênio equipado com fluxometro (sem humidificador)
- ✓ Soro fisiológico 500 ml + Jelco 18 e 20 + escalpe 19 e 21 + esparadrapo pequeno + atadura de gaze peq. + 1 garrote.
- ✓ Adrenalina 10 amps + atropina 4 amps
- Lembre-se que a RCP é mais eficaz quando realizada toda no local.
- A RCP durante transporte de ambulância ou helicóptero só poderá ser realizada se houver um compressor torácico mecânico e automático. Ainda assim sua eficácia é menor do que as compressões torácicas manuais.
- Nos afogamentos grau 3 e 4 que usualmente estão indicados o acesso invasivo das vias aéreas, a intubação será realizada de preferência na sala de emergência do hospital. Casos excepcionais serão realizados dentro da ambulância. Nestes, dar especial atenção a inserção de TOT, inflar o cuff, confirmar posição do TOT e fixa-lo.